

ประชาสัมพันธ์

เรื่องป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

การระบาดของโรคไข้เลือดออก สามารถพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะพบมากในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ดังนั้นเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว อย่าลืมป้องกันตนเองและดูแลคนที่คุณรักจากยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรค





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



อาการ



ไข้สูงเฉียบพลัน
เมื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน



มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือถ่ายอุจจาระดำ

การรักษา



ให้ยาลดไข้ “พาราเซตามอล”
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึมลง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที



มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



تبโต มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน

1. หากมีอาการ
นำส่งสัควรรีบ
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control


ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การสื่อสารความเสี่ยง
และสุขภาพ
Bureau of Risk Communication
and Health Behavior Development



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422

ไข้เลือดออก โรคร้าย ที่มี **ยุงลาย** เป็นพาหะ

www.kapook.com



อาการ

1 ไข้สูงลอย 39-40 องศา
ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ
ประมาณ 4-5 วัน



3 ตับโต กดเจ็บ
บริเวณชายโครง
ข้างขวา

2 อาการเลือดออก ต่ายดำ
อาเจียน มีจุดเลือดออกตามตัว



4 ระบบไหลเวียนเลือด
ผิดปกติ หรืออาการช็อก เกิดในช่วงไข้จะลด
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น รอบปากเขียว ชีพจรเบา
และเร็ว ความดันต่ำ

การรักษา

1 ให้อาบน้ำเย็น ใช้น้ำที่ควรใช้
คือพาราเซตามอล



2 ให้สารน้ำชดเชย ให้ดื่มน้ำเกลือแร่
บ่อยๆ ในรายที่ขาดน้ำมากๆ



3 ดูแลอาการอย่างใกล้ชิด ถ้าผู้ป่วยมีอาการ
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น คลื่นไส้ อาเจียน
ใจสั่น หน้ามืด ในช่วงไข้ลดให้รับน้ำส่ง sw. กันที

4 ตรวจเกล็ดเลือดและความเข้มข้นเลือด
เพื่อใช้พิจารณาในการให้สารน้ำชดเชย



การป้องกัน

1 ควบคุมสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ของยุงลาย เช่น ในบริเวณที่มีน้ำขัง
บ่อน้ำนิ่ง ในแจกันดอกไม้ เป็นต้น

2 ป้องกันส่วนบุคคล ใส่เสื้อแขนยาว
กางเกงขายาว ใช้ยาฆ่ายุง
ใช้กลั่นกันยุง เป็นต้น



3 ใช้สารเคมีควบคุม ใช้ทรายอะเบท ใช้ยาฆ่า
ลูกน้ำใส่ในบ่อน้ำ ใช้สารเคมีพ่นตามบ้านเพื่อฆ่า
ยุงลาย และในที่ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข



ป้องกันลูกน้อยจาก...



โรคไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มี **ยุงลาย** เป็นพาหะ เมื่อคนถูกยุงกัดจะได้รับเชื้อไวรัสเดงกีอาจจะพบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงหากไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาทันที่ว่าจะนำไปสู่การเสียชีวิต

อาการ



ไข้สูง ปวดตามตัว อ่อนเพลีย ซึม



รับประทานอาหารไม่ได้ อาเจียน ปวดท้อง



อาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่างๆ



อาการหนักจน มีภาวะช็อก และเสียชีวิต

การป้องกันโรคไข้เลือดออก



กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย



นอนในมุ้ง ทายากันยุง



ควรไปพบแพทย์เมื่อป่วย เป็นไข้ ติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

www.dhhs.go.th



สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข



Content : แพทย์หญิงประอร สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา
กุมารเวชศาสตร์ - โรคติดต่อ

Design : ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
Credit Picture : www.freepik.com