

⚠️ เเตรียมพร้อม ระวัง!! ⚠️

โรคพิษสุนัขบ้า

ANGER DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER



โรคร้ายแรง

ที่ส่งผลต่อระบบประสาท
สามารถติดได้ใน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies virus
"ยังไม่มีหนทางที่จะรักษาให้หาย"



จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ
โดยจะแพร่ผ่านบาดแผล
ส่วนมากมักติดผ่านการ
ถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด เช่น หมากัด

สามารถติดได้จาก "เชื้อไวรัส"



สามารถติดผ่านบาดแผลลอก
ตามร่างกายได้เช่น แมวข่วน
เนื่องจากแมวมักเลียมือเท้าอยู่เสมอ
ก็มีโอกาสได้รับเชื้อจากน้ำลายได้



กินเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อ
มีโอกาสติดได้ แต่น้อย
อวัยวะที่มีโอกาสติดเชื้อสูง
คือสมอง,ไขสันหลัง

ระยะฟักตัวของโรค

ภายหลังจากการรับเชื้อ



"สัตว์"

พบว่าจะแสดงอาการ
ภายใน 21-80 วัน



"มนุษย์"

สามารถแสดงอาการได้
ภายใน 2-8 สัปดาห์
(บางรายแสดงอาการหลังจากนั้นหลายปี)

ระดับอาการ (ทางคลินิก)



ระยะที่ 1

ระยะเริ่มต้น (Prodrome)

สัตว์จะแสดงอาการป่วย ซึม
แยกออกจากการเจ็บป่วยอื่นๆได้ยาก



ระยะที่ 2

ระยะตื่นตัว (Excitatory phase)

สัตว์จะแสดงอาการดุร้าย เดินเซหรือชัก
แต่ละตัวจะมีระยะดุร้ายแตกต่างกันไป




ระยะที่ 3

ระยะอัมพาต (Paralytic phase)

สัตว์จะแสดงอาการเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อ
อาการน้ำลายฟูมปาก หุบปากไม่ได้

หากสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องทำอะไร ?



สังเกตสัตว์ที่ติดเชื่อพิษสุนัขบ้า
จะมีอาการครบทั้งสามระยะ
แต่จะมีแต่ละระยะสั้นยาวไม่เท่ากัน
บางตัวไม่ซึมเลย ดูร้ายอย่างเดียว
บางตัวไม่ดูร้ายแต่มีอาการป่วยแล้วตาย



หากพบสัตว์ที่สงสัยมีอาการ
ควรกักสัตว์ไว้ประมาณ 10 วัน



หากสัตว์ตายระหว่างการกักโรค
ควรส่งสุนัขทั้งตัวใส่ถุงพลาสติก**แช่เย็น**
หรือแจ้งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้แก่ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์

“ รักษาไม่ได้ แต่ป้องกันง่าย ”



การป้องกันให้ปลอดภัยจากการติดโรคพิษสุนัขบ้า
ทั้งใน สัตว์เลี้ยง และ คน
คือการไป**ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า**ตามโปรแกรม



สามารถเริ่มทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าได้
ครั้งแรกที่อายุ 3 เดือนขึ้นไป

ปีแรกฉีดวัคซีนเข็มแรกที่อายุ 3 เดือน
ฉีดกระตุ้นที่อายุ 4 เดือน และ 1 ปี
จากนั้น ฉีดกระตุ้นเป็นประจำทุกปี

สุนัข/แมวโตที่ไม่เคยได้รับวัคซีน
ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น 2 เข็ม
ห่างกัน 4 สัปดาห์/ฉีดกระตุ้นทุกปี

ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด



ลดโอกาสเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า
คือการดูแลตนเอง ไม่ให้ถูกสัตว์กัด

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและกระตุ้น
เป็นประจำมีประโยชน์มากโดยเฉพาะ
คนที่เลี้ยงสัตว์ และ เด็ก

เราควรไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
ไว้ก่อนได้ แต่อาจไม่จำเป็นเร่งด่วน

ถ้าถูกสัตว์กัดควรไปพบแพทย์ทันที
เนื่องจาก ระดับภูมิคุ้มกันที่มีอยู่
อาจไม่สูงพอที่จะคุ้มกันโรคได้