

ไข้เลือดออกอันตราย!!

ห้ามซื้อยารับทานเด็ดขาด

โดยทุกสายพันธุ์สามารถทำให้เสียชีวิตได้ ใน 1 ชีวิตเราสามารถติดได้ถึง 4 ครั้ง โดยการติดเชื้อครั้งแรกอาการจะไม่มาก แต่ถ้ามีการติดเชื้อซ้ำจะมีความรุนแรงสูงมาก ปัจจุบันการเสียชีวิตอยู่ในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ความดัน เขาหวาน และกลุ่มเหล่านั้น ต้องรีบวินิจฉัยให้เร็ว หลีกเลี่ยงเรื่องยาที่อาจทำให้เป็นอันตราย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลศรีภูมิ ฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ระวัง!! ติดซ้ำอันตรายถึงชีวิต!!
ไข้เลือดออกระบาด ปี 67

ไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเดงกี มีด้วยกันถึง 4 สายพันธุ์

DENV-1 DENV-2 DENV-3 DENV-4

ทุกสายพันธุ์สามารถทำให้เสียชีวิตได้!!!
เราสามารถติดเชื้อเลือดออกได้ถึง 4 ครั้งถ้ามีการติดเชื้อซ้ำจะมีความรุนแรงสูงมาก หากติดเชื้อครั้งที่ 2 โดยเชื้อที่ต่างสายพันธุ์กับครั้งแรก อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออกหรือช็อก

อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด มีประจำเดือน ปริมาณมากกว่าปกติ

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ

ไข้เลือดออก

ห้ามซื้อยากานเอง
กลุ่มยาเอ็นเสด (NSAIDs)
- ไอบูโพรเฟน
- ไดโคลฟีแนค
- แอสไพริน
- นาพรอกเซน

มีผลต่อการกในครรภ์
สตรีมีครรภ์ใช้กลุ่มยาเอ็นเสด หลังสัปดาห์ที่ 20
- ภาวะน้ำคร่ำน้อย
- ความผิดปกติต่อไตของทารก
- ภาวะแทรกซ้อนต่อ ปอด แขนและขา
- บางรายเสียชีวิตแรกคลอด

ผลข้างเคียง เช่น เลือดออก แผลในกระเพาะอาหาร หัวใจวาย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ