



รู้เร็วโรคติดต่อบุรีรัมย์ • ติดตาม

6 วัน • 🎵 Steve Darko • 🌐

... ✕

บ้านใคร บ้านมัน 🦟 📌

บ้านฉันลงมือทำแล้วปลอดภัย

5ป1ข

ไข่เลือดออก ยุ่งลาย



ป. ปิด

ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุ่งลายลงไปวางไข่



ป. เปลี่ยน

เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ
ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่
จะกลายเป็นยุ่ง



ป. ปล่อย

ปล่อยปลากินลูกน้ำใน
ภาชนะใส่น้ำถาวร



ป. ปรับ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้
ปลอดโปร่ง โล่งสะอาด ลม
พัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพัก
ของยุ่งลาย



ป. ปฏิบัติ

ปฏิบัติเป็นประจำอย่าง
ต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้
ยุ่งลายเพิ่มมากขึ้น



ว. จัด

จัดดูภาชนะที่บรรจุน้ำให้
สะอาดอยู่เสมอ หลัง
การเปลี่ยนน้ำ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์



หมอ
พร้อม
UPGRADE



ยุงลาย พาหะ 3 โรคร้าย ที่มากับฤดูฝน





3 โรคร้าย ที่ยุงลายเป็นพาหะ



โรคไข้เลือดออก



โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
หรือ โรคชิคุนกุนยา





ยุงลาย กิน อยู่ ขยายพันธุ์อย่างไร

บินไกล 40-100 เมตร
หากินบริเวณบ้าน



ตัวเมียออกไข่
4-5 ครั้ง ใน 1 ช่วงชีวิต
ครั้งละ 50-150 ฟอง

ยุงลายชอบกัดคน
ในเวลากลางวัน
แต่ก็สามารถกัดกลางคืน
ได้เหมือนกัน



เพาะพันธุ์ในน้ำนิ่ง
ใส สะอาด



ชอบเกาะพัก
อยู่ตามมุมมืด



กองโรคติดต่อทางแมลง
Division of Vector Borne Diseases



รู้ทันโรคแมลง



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422